


Morbus Crohn mit perianalen Fisteln Checkliste* für die chirurgische (Weiter-)Behandlung



Für Patienten: Bitte gemeinsam mit Arzt ausfüllen. Jede vorliegende Information ist für den (weiter-)behandelnden Arzt wertvoll. Falls einige Diagnoseschritte noch nicht geklärt sind, können diese auch offengelassen werden.

ÜBERWEISENDER ARZT (AM KOOPERATIONSZENTRUM):

.....
.....
.....

PATIENTENIDENTIFIZIERUNG: Initialen: Geb.-Jahr: (≥18 Jahre)

DIAGNOSE (vor Eingriff): Morbus Crohn Luminaler M. Crohn: nicht-aktiv/gering-aktiv
 Fistel trotz medikamentöser Behandlung persistierend

Vortherapie medikamentös: Präparat:

Fistel Charakterisierung: perianal komplex **Beschreibung** des Fistelverlaufes:
.....
.....
.....

Vortherapie chirurgisch: keine Abszess-Spaltung Seton-Drainage
andere

CHIRURGISCHE (WEITER-)BEHANDLUNG (AM ANWENDUNGSZENTRUM):

Durchführender Arzt:

Chirurgischer Eingriff: am Ausschluss Abszess

Bemerkungen:

NACHSORGE AM ANWENDUNGS- ODER KOOPERATIONSZENTRUM:

Empfohlen am oder Woche(n) nach chirurgischem Eingriff

Bewertung äußere Fistelöffnung: Inspektion Fingerkompression

*Diese Checkliste ist für den behandelnden Arzt und den Patienten bestimmt.



Takeda Pharma Vertrieb GmbH & Co. KG,
Jägerstraße 27, 10117 Berlin